



S Laboklinom k diagnóze – hypotyreóza u psov



S Laboklinom k diagnóze – hypotyreóza u psov



Ďalšie parametre štítnej žľazy

→ fT4 (voľný T4)

- Zvyčajne koreluje s celkovým T4, ale je trochu viac špecifický.
- Podobne ako T4, je ovplyvnený ďalšími faktormi.

→ fT4 dialýza

- Equilibrium dialýza

→ T3 (celkový trijódtyronín)

- Doplnkový parameter, periférna premena T4 na T3 prebieha len v prípade potreby a T3 je vylučovaný štítnou žľazou len v limitovanom rozsahu.
- Relevantný v prípadoch s podozrením na protilátky proti T4.

→ Tyreoglobulín protilátky (TgAb)

- Používajú sa na diagnostiku autoimunitnej tyreoiditídy u psov.
- Dôkaz TgAb nezodpovedá diagnostike hypotyreózy.

→ T3/T4 protilátky

- Nevhodné ako samostatný parameter pre diagnostiku hypotyreózy, ale môžu podporiť diagnózu.
- Užitočné, pokiaľ je podozrenie na falošné zvýšenie koncentrácií T3/T4 kvôli prítomnosti protilátok.
- Môže zavážiť pri výbere chovných zvierat.

Profily v Labokline

Štítna žľaza profil	T4, fT4, T3, fT3, TSH, TgAb, T4 Ab, T3 Ab
Hypotyreóza/NTI profil	T4, fT4, rT3, TSH, cholesterol
Štítna žľaza monitoring	kreatinín, SDMA, ALT, AP, T4, TSH, troponín I (sérum chladené!)

Ďalšie parametre štítnej žľazy a profily nájdete v „MyLab“.

