

Mala by sa zvážiť **alergén-špecifická imunoterapia (ASIT, hyposenzibilizácia)** (možná len pri atopickej dermatitíde = alergii na pele tráv, burín a stromov, hmyz, prachové a potravinové roztoče a plesne). Pri alergén-špecifickej imunoterapii sa roztoky lieku pripravujú špeciálne pre vášho psa na základe výsledkov alergického testu. Tieto roztoky obsahujú malé množstvá látok (alergénov), na ktoré vaše zviera v predchádzajúcom alergickom teste reagovalo pozitívne. Tieto zodpovedné alergény sa potom zvieraťu injekčne podávajú podkožne, spočiatku v rastúcich dávkach a v rastúcich intervaloch.

U väčšiny psov vedie táto liečba k vyššej tolerancii voči alergénom spôsobujúcim ochorenie. Výsledok: váš pes sa opäť cíti pohodlne vo svojom prostredí. Zlepšenie sa môže prejaviť už po niekoľkých týždňoch, ale v niektorých prípadoch až po niekoľkých mesiacoch až roku. U viac ako **70 % zvierat vedie táto forma terapie k významnému zlepšeniu** alebo dokonca úplnému vymiznutiu príznakov.

Keďže alergie nie sú vyliečiteľné, alergén-špecifická imunoterapia by sa mala v prípade úspechu podávať celoživotne. V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, ktoré sa zvyčajne prejavujú len ako krátkodobé, mierne zhoršenie príznakov. Tieto sa zvyčajne dajú ľahko zvládnuť úpravou dávkovania veterinárom.

Je potrebné zvážiť, že alergia je **celoživotný stav**, ktorý sa vo všeobecnosti nedá vyliečiť a môže byť aj dedičná. Postihnuté zvieratá by mali byť vylúčené z chovu. Iba presná znalosť spúšťačov, cielené vyhýbanie sa týmto alergénom a alergén-špecifická imunoterapia výrazne zlepšia kvalitu života vášho psa.

Pre cielenú liečbu potrebuje váš veterinár presné a spoľahlivé laboratórne výsledky, a práve preto spolupracuje so spoločnosťou Laboklin. Spolu s veterinárom budete môcť stanoviť správnu diagnózu, identifikovať kauzálne alergény a začať vhodnú **liečbu** na dosiahnutie **optimálnej kvality života** pre vás a vášho štvornohého priateľa.

Rýchly prehľad

Alergie
= reakcie z precitlivenosti

Alergie sa môžu prejavovať mierne, ale môžu tiež významne a negatívne ovplyvniť kvalitu života.

Hlavné príznaky
svrbenie a rôzne závažné zmeny na koži

Výskyt príznakov
v závislosti od alergie alebo spúšťacieho alergénu, výskyt možný od šteňacieho veku až do vyššieho veku, sezónne alebo celoročne, na špecifických miestach (tvár, labky, medziprstia) alebo na celom tele

Najčastejšie príčiny u psov
blchy, prachové roztoče, pele, rôzne zložky krmiva

Postup testovania
vylúčenie iných ochorení, presná anamnéza, klinický obraz, kožné a/alebo krvné testy, eliminačná diéta

Podozrenie na alergiu na krmivo
tiež si všímať hnačku, vracanie alebo častú defekáciu

Základ každej diagnózy
presná analýza a laboratórne testy v dobrom a renomovanom laboratóriu

4Paws – aplikácia, ktorá pripomenie

Už nikdy nezabudnite podať lieky a buďte dokonale pripravení na cestovanie! Všetko je možné s aplikáciou 4Paws!

inštalovať bezplatne a bez reklám z app stores

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Veterinárna prax

(pečiatka)

Servis
Tento informačný leták ako aj ďalšie dôležité informácie nájdete na našej webovej stránke.

www.laboklin.sk

LABOKLIN s. r. o.
Laboratórium pre klinickú diagnostiku

SK
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava
Slovensko
Tel. +421 2 32339020
E-mail labor.ba@laboklin.com
Web **www.laboklin.sk**

Stav k: október 2026
Zdroj obrázkov a obsah:: Fotolia, Pixabay, Dr. Regina Wagner, Laboklin

LABOKLIN

Alergie u psa



Rady & tipy
Informačné letáky od vášho veterinára a LABOKLINu

Rady & tipy



Prvé známky alergie

Alergia na blchy
Čas, miesto a lokalizácia sú prvými dôležitými indíciami. Ak sú príznaky najsilnejšie od jari do jesene, často to poukazuje na alergiu na sliny bĺch.

Atopická dermatitída (alergény prostredia)
Alergia na prachové a potravinové roztoče sa prejavuje po celý rok – príznaky sa môžu zhoršiť, ak zviera spí napríklad v spálni. Preto venujte pozornosť prostrediu, v ktorom sa váš pes pohybuje. Pri alergii na pele sa často pozoruje sezónne zhoršenie príznakov.

Alergia na zložky krmiva
V tomto prípade je niekedy možné preukázať priamu súvislosť s potravou. Príznaky sa však môžu objaviť aj s výrazným oneskorením – dokonca aj niekoľko dní po kŕmení. To často značne sťažuje identifikáciu priamej súvislosti. Prechod z jednej značky krmiva na druhú, alebo z jednej príchute na druhú, zvyčajne neprináša žiadne zlepšenie. Dôkladná analýza životných podmienok zvieraťa veterinárom poskytuje správny východiskový bod pre diagnostiku alergie.





Symptómy

Prvé príznaky sa u psov najčastejšie objavujú vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Výnimkou sú potravinové alergie, ktoré sa môžu objaviť už v šteňacom veku alebo len u veľmi starých psov. Alergie sa môžu vyvinúť u





psov všetkých plemien, ale vzhľadom na to, že predispozícia je tiež dedičná, niektoré **plemená**, ako napríklad West Highland White teriéry, francúzske buldočky, boxery, retrívery a nemecké ovčiaky, sú za určitých okolností viac postihnuté. Prvým viditeľným príznakom je intenzívne svrbenie. Zmeny kože a srsti, ako je **začervenanie, chrasty, lysiny** atď., sa zvyčajne objavia až po svrbení. Sú výsledkom autotraumatizácie (škrabanie, olizovanie) a často sú sekundárne infikované baktériami alebo kvasinkami.

Tieto zmeny pozorujeme najmä v oblasti tváre a na labkách (hlavne v priestore medzi prstami). Klinický obraz dopĺňa aj výskyt chronických, opakujúcich sa **zápalov uší**. U niektorých zvierat sa vyskytujú aj alergické **ochorenia dýchacích ciest** alebo **zápaly spojiviek**. Alergia na blchy je naopak forma ochorenia, ktorá sa väčšinou prejavuje na zadnej časti tela a na **koreni chvosta**.
U zvieraťa s alergiou na krmivo sa môžu niekedy navyše (alebo aj ako jediné príznaky) vyskytnúť **hnačka, vracanie a častejšia defekácia**.

Diagnostika

Keďže aj iné ochorenia môžu spôsobiť svrbenie a kožné zmeny, váš veterinár sa pokúsi prostredníctvom cielených vyšetrení **vylúčiť** tieto **ďalšie možné príčiny**. O tom, ktoré vyšetrenia sú vhodné, rozhodne váš veterinár na základe charakteru zmien a na základe klinického obrazu. Môžu sa napríklad odobrať stery, odtlačky alebo vzorky srsti na vyšetrenie prítomnosti baktérií alebo plesní. Okrem toho je možné poslať do laboratória kožné zoškraby na vyšetrenie kožných parazitov alebo kožné biopsie na ďalšiu diagnostiku. Niektoré iné ochorenia sa dajú objasniť alebo vylúčiť pomocou krvných vyšetrení. Akonáhle sú všetky ostatné možné ochorenia vylúčené, váš veterinár podnikne ďalšie kroky smerom k **diagnostike alergie**.

Aké testy na alergie máme k dispozícii?

V zásade sa rozlišujú 2 testovacie metódy:
Kožné testy (intrakutánny test)
Zvieraťu sa injekčne podajú



rôzne alergény (peľ, roztoče atď.) priamo do kože. Na základe zmien v mieste vpichu môže veterinár zistiť, či je prítomná alergická reakcia na danú látku, alebo nie.

Krvné testy (sérológia)
Pri niektorých alergiách sa v krvi objavujú **protilátky** proti **alergénom** (t. j. látkam, ktoré vyvolávajú alergie). Tieto protilátky sa dajú v krvi zistiť pomocou sérologického testu na alergiu, preto váš veterinár potrebuje na tento typ testu na alergiu vzorku krvi od vášho zvieraťa, ktorú pošle na analýzu do dôveryhodného laboratória.

Žiadny z týchto testov nemožno použiť univerzálne. Váš veterinár vyberie a kriticky zhodnotí test, ktorý je pre vaše zvieratko najvhodnejší.





Špeciálny prípad
Alergia na krmivo

Potravinové alergie sú **ťažko diagnostikovateľným ochorením**. Dôvodom je, že imunitný systém gastrointestinálneho traktu reaguje u každého psa inak. Spoľahlivá diagnóza je možná iba **pri eliminačnej diéte**. Tá si vyžaduje 100 % dodržiavanie zo **strany majiteľa** domáceho zvieraťa a je veľmi ťažké ju zaviesť v domácnostiach s malými deťmi, staršími ľuďmi alebo viacerými zvieratami. Pre diagnostiku a úspešnú liečbu je absolútne nevyhnutné, aby boli všetky potraviny, okrem diéty predpísanej veterinárom, prísne zakázané – v záujme zdravia vášho štvornohého priateľa. Eliminačná diéta trvá až tri mesiace. Počas tejto doby môže byť zviera kŕmené iba špeciálnou diétou, ktorá je dostupná iba od veterinára, alebo domácou diétou s vybranými ingredienciami. Váš zverolekár vám rád podrobne poradí so zložením tejto diéty.

Ak príznaky počas diéty vymiznú, za vznik ochorenia bola pravdepodobne zodpovedná jedna alebo viac zložiek predchádzajúceho



krmiva. Následne sa pôvodné krmivo opäť zaradí („**provokačná diéta**“). Opakovaný výskyt príznakov potom definitívne dokazuje prítomnosť potravinovej alergie. Krvný test (**sérologický test na potravinovú alergiu**) dokáže zistiť protilátky produkované v reakcii na rôzne zložky krmiva.
Tieto testy vám a vášmu veterinárovi pomôžu vybrať **vhodné krmivo pre eliminačnú diétu**. Existujú však aj formy potravinovej intolerancie, ktoré nie sú alergického pôvodu, čo znamená, že sa netvoria žiadne protilátky. V takýchto prípadoch do diéty vyberte zložky, ktoré ste ideálne ešte nikdy predtým psovi nepodávali.

Alergény sú známe, čo ďalej?

Liečbou 1. voľby by malo byť **vyhýbanie sa** spúšťacím alergénom. V prípade **alergie na blchy** alebo alergie na krmivo je to relatívne jednoduché a je to zároveň jediná forma liečby. V tomto prípade je úspešná vhodná diéta alebo vhodné produkty na kontrolu bĺch. Avšak v prípade alergie na pele alebo prachové roztoče nie je zvyčajne možné vyhnúť sa spúšťacím alergénom. Pri alergiách, ktoré spôsobujú zvieraťu nepohodlie len krátkodobo každý rok (< 4 mesiace), môžu počas tohto obdobia poskytnúť úľavu rôzne lieky. V prípadoch **dlhšie trvajúcich** alebo **celoročných príznakov** sú však vedľajšie účinky medikamentóznej terapie často príliš závažné.